

# Příroda

Petr Macháček

## Zámecký rybník

Zámecký rybník v Lednici je součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Známa je kolonie volavek a kvakošů, která je trvale obsazena již od roku 1923. Žijí zde však i další druhy vodních ptáků a jejich výskyt je ovlivňován stavem vody.

V rybnících bývají zpravidla velmi vysoké obsádky kaprů. Ti veškerou dostupnou potravu sežerou a musí být dále dokrmováni obilím, případně i jinou potravou. Kapři zkonsumují především zooplankton, který pak nemůže filtrovat vodu, a v důsledku toho se následně rozmnoží mikroskopické řasy. Při hledání potravy kapři ryjí v bahně, čímž kalí vodu, a vyloví zde veškeré živočichy. Výsledkem vysoké obsádky kaprů v rybníku je pak kalná voda s minimální průhledností a bez potravy pro ptáky.

Z uvedených důvodů stanovuje ochrana přírody maximální velikost obsádek. Ta však ze strany nájemců rybníků nebývá vždy dodržována. Tak tomu bývalo na Zámeckém rybníku v posledních letech zcela pravidelně, a proto byla s nájemcem smlouva zrušena. V roce 2004 zůstal rybník tedy zcela bez násady. Dostaly se sem jen drobné ryby z Dyje, které proplavaly přes česla. Díky tomu zde byla celoročně čistá voda a velké množství ptáků. V létě se na části vodní plochy rozmnožily vláknité řasy, které vytvářejí povlaky i na hladině. Později zmizely a ve větším rozsahu se na hladině rozrostl okřehek. Určitě se objevily i další vodní rostliny, pozoroval jsem např. poměrně vzácný růžkatec potopený. Tato vegetace neměla na ptáky negativní vliv a ani z estetického hlediska nepůsobila v kontextu s okolní přírodou zámeckého parku rušivě.

Ptáky na Zámeckém rybníku sleduji poměrně málo (na rozdíl od ostatních rybníků NPR Lednické rybníky), přesto se dají i z těchto pozorování učinit závěry. Následující údaje vycházejí z celkem 67 kontrol, které jsem uskutečňoval vždy od března do listopadu v letech 1996 až 2004. Výsledky jsou stručně komentovány dle jednotlivých druhů vodních ptáků, kteří jsou řazeni podle zoologického systému.



Zámecký rybník (foto Petr Macháček)



Kvakoš noční (foto Petr Macháček)

**Potápka malá** (*Tachybaptus ruficollis*)

Vyskytovala se ojediněle, v letech 2000–2003 nebyla pozorována žádná. Neobvyklá byla početnost v roce 2004, kdy jsem zaznamenal sedm rodnin.

**Potápka roháč** (*Podiceps cristatus*)

Téměř pravidelně zde jeden až dva páry hnízdily, v roce 2004 tu hnízdily tři páry.

**Kormorán velký** (*Phacrocorax carbo*)

Vyskytuje se tu nepravidelně, v roce 2001 jeden pár zahrnul a vyvedl dvě mláďata. Na podzim kormoráni občas nocují na stromech rostoucích na ostrovech – např. 31. 10. 2001 bylo viděno 140 exemplářů. Zvýšený výskyt byl zaznamenán v roce 2002 – pravidelně kolem deseti exemplářů, 20. 8. 2002 dva a čtyřicet exemplářů. V následujícím roce jsem pozoroval pouze jednou jeden exemplář, rovněž v roce 2004 zaznamenány jedenkrát (29. 3.) dva exempláře.

**Kvakoš noční** (*Nycticorax nycticorax*)

Na dvou ostrovech hnízdí pravidelně kolem 250 párů. Jejich početnost je značně vyrovnaná.

**Volavka stříbřitá** (*Egretta garzetta*)

Od počátku června 2000 se zdržovaly v kolonii čtyři exempláře, jeden pár zřejmě postavil hnízdo. 17. 6. 2003 zaznamenan jeden exemplář.

**Volavka bílá** (*Egretta alba*)

Pozorována pouze několikrát: 31. 10. 2001 patnáct exemplářů, 1. 11. 2002 sedmnáct exemplářů a po jednom exempláři 27. 11. a 4. 12. 2002.



Volavka popelavá (foto Petr Macháček)

### **Volavka popelavá** (*Ardea cinerea*)

Každoročně hnízdí na třech ostrovech. Početnost kolísala mezi 200 a 260 páry, v posledních letech jsou stavy nižší.

### **Labuť velká** (*Cygnus olor*)

Zaznamenával jsem nepravidelně jeden až čtyři exempláře (16. 4. 2004 výjimečně 17 exemplářů), jeden pár hnízdil v roce 1998, 2003 a 2004.

### **Husa velká** (*Anser anser*)

Nepravidelně tu hnízdí - zaznamenal jsem dvě rodiny v roce 1998 a 2000 a po jedné rodině v letech 1999, 2001, 2003 a 2004.

### **Kopřivka obecná** (*Anas strepera*)

Vyskytuje se poměrně pravidelně v počtu od několika jedinců až po asi 20 exemplářů (zvýšená početnost byla na jaře roku 2004 - 29. 3. zaznamenáno 47 exemplářů), na podzim početnost vzrůstá na 30 až 50 exemplářů, max. 200 exemplářů bylo zaznamenáno 21. 10. 2000. V roce 1999 byly pozorovány dvě rodiny, po jedné rodině v letech 1997, 2000 a 2004.

### **Čírka obecná** (*Anas crecca*)

Objevuje se tu zcela nepravidelně v počtu nejvýše několika exemplářů.

### **Kachna divoká** (*Anas platyrhynchos*)

Vyskytuje se zde zcela pravidelně a početně. Na jaře bývá přes sto exemplářů, pak až několik desítek, od srpna mnoho set - např. 9. 9. 1997 zaznamenáno 1300 exemplářů, 21. 10. 2000 pak 1500 exemplářů. Pravidelně několik párů hnízdí, pozoroval jsem jednu až několik rodin - nejvíce čtyři v letech 1999 a 2004.



Zrzohlávka rudozobá (foto Petr Macháček)

**Čírka modrá** (*Anas querquedula*)

Nepravidelně se objevuje jeden až několik exemplářů (max. 16 exemplářů 25. 3. 2003).

**Lžičák pestrý** (*Anas clypeata*)

Několik pozorování v posledních třech letech – max. pět exemplářů 16. 4. 2004.

**Zrzohlávka rudozobá** (*Netta rufina*)

Vyskytuje se tu pravidelně od několika exemplářů až po max. 35 exemplářů – pozorováno 4. 6. 2004. Pravidelně hnízdí – zaznamenal jsem každoročně jednu rodinu, pouze v roce 1998 dvě rodiny, v roce 2004 pět rodin.

**Polák velký** (*Aythya ferina*)

Pravidelně se zde vyskytuje do několika desítek jedinců (poměrně neobvyklé maximum 107 exemplářů zaznamenáno 12. 3. 1997), zvýšená početnost byla v roce 2004. Nepravidelně hnízdí – jednu rodinu jsem pozoroval v letech 1996 a 2000, čtyři rodiny v roce 2004.

**Polák malý** (*Aythya nyroca*)

Výjimečné pozorování jednoho exempláře 8. 7. 2003.

**Polák chocholačka** (*Aythya fuligula*)

Pravidelně se zde vyskytuje do několika desítek jedinců, max. 125 exemplářů zaznamenáno 29. 3. 2004. Pravidelně hnízdí – pozoroval jsem zpravidla jednu rodinu, v roce 2000 dvě rodiny a v roce 2004 tři rodiny.

**Slípka zelenonohá** (*Gallinula chloropus*)

Pozoroval jsem je tu jednotlivě a zcela nepravidelně. Rodinu jsem zaznamenal v roce 1997 a 2002, v roce 2004 pak dvě rodiny.

**Lyska černá (*Fulica atra*)**

Pravidelně se zde vyskytuje do deseti jedinců, max. 48 exemplářů zaznamenáno 3. 9. 2004. Obvykle tu jeden až dva páry hnízdí, v roce 1999 hnízdily tři páry, v roce 2004 osm párů.

**Racek chechtavý (*Larus ridibundus*)**

Objevují se tu nepravidelně, většinou na jaře či na podzim – zpravidla ve velkých počtech: např. 29. 3. 2002 zaznamenáno 450 exemplářů, 29. 3. 2004 zaznamenáno 1000 exemplářů.

**Rybák obecný (*Sterna hirundo*)**

Nepravidelně, ale poměrně často se objevuje jeden až několik jedinců, max. osm exemplářů viděno 12. 6. 2002.

**Ledňáček říční (*Alcedo atthis*)**

Bývá zde téměř pravidelně jeden až několik jedinců, max. pět exemplářů zaznamenáno 26. 9. 2003. Pravidelně hnízdí na přílehlé Dyji, pravděpodobně občas i přímo na rybníku ve stržených březích ostrovů.

**Rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*)**

Každoročně tu hnízdí jeden pár, v roce 2004 zpívali čtyři samci.

V roce 2004 bylo na Zámeckém rybníku více vodních ptáků než v předcházejících letech, zejména pak zde v daleko větších počtech hnízdili. To se netýká volavek a kva-košů – tito ptáci tu sice hnízdí, ale potravu loví v širokém okolí. Největší nárůst byl zaznamenán u potápky malé, lysky černé, slípky zelenonohé a rákosníka velkého, dále pak u rzohlávky rudozobé, poláka velkého a poláka chocholačky, částečně i u kachny divoké a potápky roháče. Je evidentní, že ptákům rybníky bez násady kaprů vyhovují.



Ledňáček říční (foto Petr Macháček)